



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

# Sodbrennen Blocker

## MEDIZINPRODUKT

### Schnelle Linderung von Beschwerden bei Sodbrennen und Verdauungsstörungen

Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Auslöser für Sodbrennen, saures Aufstoßen oder Verdauungsstörungen sind häufig bestimmte Ernährungsgewohnheiten wie zu fettes oder zu scharfes Essen, Alkoholgenuss, Nikotin aber auch Übergewicht. Hierbei gelangt Magensäure in die Speiseröhre und führt in der Folge zu den entsprechenden Beschwerden.

Sodbrennen Blocker bietet eine schnelle Abhilfe dieser Beschwerden und sorgt für langanhaltende Linderung.

Er bildet im Magen eine rasch schützende Barriere und verhindert damit das Aufsteigen des sauren Mageninhaltes in die Speiseröhre. Die empfindliche Schleimhaut wird nicht mehr angegriffen und die Symptome werden rasch gelindert.

#### **Anwendungsgebiet:**

Linderung von Beschwerden, wie Schmerzen und Unwohlsein, bei Sodbrennen oder Verdauungsstörungen.

#### **Zusammensetzung:**

1 Tablette enthält:

Wirkstoff: Braunalgenextrakt.

Hilfsstoffe: Natriumbicarbonat, Calciumcarbonat, Tricalciumphosphat, Magnesiumstearat, Pfefferminz-Aroma, Sorbitol, Sucralose, Mikrokristalline Cellulose.

#### **Dosierung und Einnahmeempfehlung:**

Die Tablette vor dem Schlucken gründlich kauen.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren:

Beim Auftreten von Symptomen 2 bis 4 Tabletten nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen einnehmen.

Die Tageshöchstmenge von 16 Tabletten sollte nicht überschritten werden. Bei der Einnahme gemäß diesen Angaben ist die Anwendung bei schwangeren und stillenden Frauen im Allgemeinen als sicher anzusehen, doch ist vor Einnahme jedes Medikaments eine Beratung durch einen Arzt oder Apotheker zu empfehlen.

Kinder unter 12 Jahren: Nur auf Anraten eines Arztes einnehmen.

#### **Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:**

Bei Bestehen einer Allergie gegenüber einem der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht eingenommen werden.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker:

- vor der Einnahme von Sodbrennen Blocker, falls Sie eine Diät mit stark eingeschränkter Natriummenge erhalten oder ein Nierenproblem besteht, da in Sodbrennen Blocker Natrium und Calcium enthalten sind.
- nach der Einnahme von Sodbrennen Blocker, falls die Symptome auch nach einer Woche noch anhalten oder Sie Allergiesymptome wie Hautausschläge oder Atemnot oder sonstige Nebenwirkungen feststellen.
- falls andere Erkrankungen bestehen.

- Es wird empfohlen bei Einnahme der folgenden Arzneimittel eine Pause von 2 Stunden vor der Einnahme von Sodabrennen Blocker einzuhalten:

- H2-Antihistaminika
- Tetracyclin
- Fluorchinolon
- Digoxin
- Eisensalze
- Ketoconazol
- Neuroleptika
- Thyroxin
- Penicillamin
- Atenolol, Metoprolol, Propanolol
- Chloroquin (Chlorochin)
- Bisphosphonate

Bei Überschreiten der angegebenen Höchstdosis kann es zu Blähungen kommen. Die Wirkung des Produktes kann bis zu vier Stunden anhalten.

**Lagerung:**

Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt in der Original-Verpackung lagern



Nicht über 25 °C lagern.

**Verfalldatum:**

Siehe Faltschachtelboden und Blister.

**Bedeutung der Symbole auf Packung:**



Hersteller



Temperaturbegrenzung



Trocken lagern



Gebrauchsanweisung beachten



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis

**Stand der Information:** 07.2021



Dr. Kleine Pharma GmbH  
Heidsieker Heide 114  
D-33739 Bielefeld

CE 0297

8618931039  
448\_REV01/G01